

۳- ارزیابی جامع فناوری آنژیوپلاستی اولیه در مقایسه با دارودرمانی در بیماران مبتلا به سکته فوق حاد قلبی^۱

بیماران مبتلا به سکته فوق حاد قلبی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند عموماً تحت دارو درمانی قرار می‌گیرند که در صورت ارائه در ساعات اولیه بروز سکته می‌تواند تأثیر مثبت بالینی فراوانی داشته باشد. با این حال یکی از عوارض مهم افزایش خطر خونریزی مغزی است که موجب محدودیت کاربرد دارو درمانی می‌شود. شواهد بالینی اخیر نشان می‌دهد که روش آنژیوپلاستی اولیه به عنوان روش جایگزین برای درمان این بیماران محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته مطالعه سریع بر شواهد بالینی ارائه خدمت آنژیوپلاستی صورت گرفته است که با توجه به اهمیت موضوع و انتشار شواهد جدید به روزرسانی مطالعه و انجام مطالعه اقتصادی ضرورت می‌یابد. لذا از پژوهشگران انتظار می‌رود که در قالب ارزیابی فناوری سلامت به مطالعه اثرات بالینی و اقتصادی ارائه آنژیوپلاستی اولیه بپردازند.

^۱ *ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI)*